Nebenwirkungsmanagement von Hautreaktionen unter moderner onkologischer Therapie

Katharina C. Kähler

UNIVERSITÄTSKLINIKUM SCHLESWIG-HOLSTEIN, Campus Kiel
Klinik für Dermatologie, Venerologie und Allergologie

Wandel in der Krebstherapie

- neue Formulierungen zur Vermeidung von Toxizität
- zielgerichtete Therapien mit neuartigen Nebenwirkungen

Häufigkeit kutaner Toxizität

„Rash“/„Akne“	43-90% (→ Cetuximab)
Juckreiz	8-57% (→ Panitumumab)
Nagelentzündung	16%
Trockene Haut	10-13%

Dosisreduktion/Therapieabbruch bei 9-12 % der Patienten

Robert et al, Lancet Oncol 2005;6:491-500

Moderat bis schwer (Grad 3)

- Basistherapie wie bei Grad 1+2
- Tetracyclin 250 mg 2× tgl oder
- Minocyclin 50 mg 2× tgl

Sinn einer Antibiotika-Prophylaxe?

- 61 Patienten unter EGFR-I-Therapie
- 500 mg Tetrazyklin 2 mal täglich vs. Placebo über 28 Tage nach Therapiestart
- kein Effekt auf „rash“-Inzidenz
- aber : „rash“ signifikant weniger schwer
- weniger „rash“ → weniger benefit?

Jatoi et al, Cancer 2008;113:847-53

Fissurenbildung

- schmerzhaft, berührungsempfindlich
- langwierige Abheilung
- feuchtes Okklusivmilieu günstig
- Hydrokolloidverbände
(z.B. Comfeel®)

Paronychien

- meist nach 2-3 Monaten
- häufig Großzehe
- erhebliche Schmerzen
- eitrige Entzündung
- Antibiotikum nach Antibiogramm
- antiseptische Bäder
- weites Schuhwerk!
- richtige Nagelpflege!

Haarveränderungen

- nach Monaten, nicht sehr häufig
- v.a. bei Therapie mit Erlotinib und Gefitinib
- Haare werden feiner, lockerer, brüchiger
- vermehrter Flaum im Gesicht
- Wimpern und Augenbrauen wachsen länger

Imatinib (Gleevec®)

- Hauttoxizität bei 10-89 % der Patienten
- Exantheme, Pruritus, Ödeme
- Beginn meist innerhalb der ersten Wochen
- Dosisabhängigkeit, v. a. > 400 mg

Pföhler & Ugurel, Hautarzt 2008;59:814-20

Häufigkeit kutaner Toxizität: Docetaxel

Alopezie	79 %
Nagelveränderungen	58-88%
Schleimhaut	50 %
Anaphylaxie	25 %
Hand-Fuß Syndrom	1,8 % (Grad 3)

Ford et al 2006, Fachinformation

Kutane Toxizität: Capecitabine (Xeloda®)

Hand-Fuß-Syndrom 50 % (10%)
Alopezie mittelstark
Xerosis
Nagelveränderungen

Saif et al. 2008

Nagelveränderungen

Mitotische Aktivität Nagelmatrix ↓
Onycholyse: 5-FU, Docetaxel, Doxorubicin
Mees-Streifen (= Leuconychia transversa): Docetaxel
Beau-Reil Furchen: 5-FU, Docetaxel
Onychomadesis: Docetaxel weekly

Scott et al 2005

Einteilung: Nagelveränderungen

Grad 1: Verfärbung, dünn und brüchig
Grad 2: teilweise oder kompletter Verlust des Nagels, Schmerzen im Nagelbett
Grad 3: Beeinträchtigung der „ADL“

CTCAE v3.0

Nagelveränderungen: Docetaxel- Prophylaxe und Therapie?

- G-CSF?
- Zusammenhang mit Neuropathie?
- “atraumatisches Verhalten”

Baker et al 2009

Schleimhaut: Mukositis

- Orale Mukositis, meist nach 5-7 Tagen
- Bei Capecitabin, Docetaxel, Doxorubicin
- Brennende Schmerzen, Atrophie, Ulzerationen, Mundtrockenheit, Vesikel/Blasenbildung
- Meist Abheilung nach 2-3 Wochen
- Candida!
- Eiswürfel, Chlorhexidin...

Sorensen et al. 2006

Schleimhautveränderungen

- Empfindlichkeit ↑ Verletzlichkeit ↑
- Lippenpflegestifte
- Mund: Salbeitee, Lidocaingel bei schmerzhaften Läsionen
- genital: kaltgepresstes Olivenöl, bei Frauen: estradiolhaltige Cremes (z.B. Linoladiol® N Creme)
- anal: pflegende Lotionen (z.B. Asche® Basislotion)

Sebostatische Hautveränderungen

- trockene, empfindliche Haut
- zunehmende Hautempfindlichkeit mit Rötung
 - parfümfreie Pflegeprodukte (z.B. Abitima face®, Lipoderm® Serie)
 - Dusch- und Badeöle (z.B. Balmandol Ölbad®)
 - harnstoffhaltige Pflegelotionen (z.B. Excipial U Lipolotio®)

Hand-Fuß-Syndrom (Palmo-plantare Dysästhesie)

- Ätiologie unklar
- Mikrotraumata im Gefäßsystem
- abhängig von Dosis und Applikationsintervall
- meist selbstlimitierend nach 1-2 Wochen

Bei: Capecitabine, 5-FU, Docetaxel, Doxorubicin (liposomal)

van Moos, Hauschild, Eur J Cancer 2008

Hand-Fuß-Syndrom (Palmo-plantare Dysästhesie)

- unbestimmtes Kribbeln
- Taubheitsgefühl
- Ödeme
- schmerzhaft-schuppene Dermatitis
- Erythem, Hyperämie, Ulzerationen, Nekrosen

Einteilung: Hand-Fuß-Syndrom

Grad 1: gering ausgeprägtes schmerzloses Erythem

Grad 2: erythematöse Hautveränderungen (Abschuppung, Blasen, Blutung, Ödem) oder Schmerz ohne Funktionseinschränkung

Grad 3: Ulzerative Dermatitis oder Hautveränderungen, die mit Schmerzen oder Funktionseinschränkungen einhergehen

Hand-Fuß-Syndrom: Prophylaxe?

Präklinisch und in Fallberichten: positiver Effekt von Pyridoxin auf HFS
Neue Daten: in doppel-blinder, placebo-kontrollierter Studie kein positiver Effekt für Pyridoxin nachgewiesen !

Lee, Proc Am Soc Clin Oncol 2007;25:9007 (abstract)
van Moos, Hauschild, Eur J Cancer 2008

Hand-Fuß-Syndrom (Supportive) Therapie:

- kühlende Hand-/Fußbäder
- Druckentlastung
- harnstoffhaltige Externa
- glucocorticoidhaltige Externa Klasse III-IV ggf. Folienokklusion, wie z.B. Betnesol V® Creme oder Dermoxin® Creme